



ARTICA²

RANDOMIZED TRIAL

MODIFIED HEAR(T) SCORE *

<u>History</u> (Anamnese)	Erg verdacht	2
	Matig verdacht	1
	Mild verdacht	0
<u>ECG</u>	Significante ST-depressies	2
	Niet-specifieke repolarisatiestoornissen	1
	Linker bundeltak blok of pacemakerritme	1
	Normaal	0
<u>Age</u> (Leeftijd)	≥65 jaar	2
	45-65 jaar	1
	<45 jaar	0
<u>Risk factors</u> (Risicofactoren)	≥3 risicofactoren <i>OF</i> voorgeschiedenis van atherosclerotisch lijden	2
	1 of 2 risicofactoren	1
	Geen risicofactoren	0

ARTICA²

RANDOMIZED TRIAL

Toelichting:

Anamnese:

- **Erg verdacht:**

- Drukkende pijn achter het borstbeen

In combinatie met minimaal twee van onderstaande symptomen:

- Misselijkheid, braken en zweten
- Uitstralende pijn naar armen, schouderbladen of kaak
- Pijn neemt toe bij inspanning
- Pijn neemt snel af na nitrospray (binnen 10 min)

- **Matig verdacht:**

- Drukkende pijn achter het borstbeen

In combinatie met maximaal één van onderstaande symptomen:

- Misselijkheid, braken en zweten
- Uitstralende pijn naar armen, schouderbladen of kaak
- Pijn neemt toe bij inspanning
- Pijn neemt snel af na nitrospray (binnen 10 min)

OF

Aspecifieke pijn op de borst maar wel herkenbaar van eerder infarct

- **Mild/niet verdacht:**

- Scherpe of stekende pijn
- Pijn afhankelijk van houding
- Geen uitstralende pijn
- Op te wekken door erop te drukken of bij inademen
- Pijn neemt niet toe bij inspanning
- Pijn op de borst die enkele seconde duurt

Risicofactoren:

- Roken (of <90 dagen geleden gestopt)
- Hypertensie of medicatiegebruik hiervoor
- Diabetes mellitus of medicatiegebruik hiervoor
- Obesitas (BMI > 30 kg/m²)
- Hypercholesterolemie of medicatiegebruik hiervoor
- Positieve familieanamnese voor hart- en vaatziekten (1^e graad én <65 jaar voor mannen/ <60 jaar voor vrouwen)